Poliklinika MEDICON Budějovická

Pravidla pro indikaci EEG

Vhodná indikace EEG:

- výskyt epileptických záchvatů – při stanovení diagnózy epilepsie, ke zpřesnění diagnostiky určitého epileptického syndromu
- zhodnocení rizika rekurence záchvatů po prvním nevyprovokovaném epileptickém záchvatu
- porucha vědomí, stav zmatenosti – k vyloučení status epilepticus

Klinické situace, kdy vyšetření může být ve specifických případech indikováno, zpravidla až v průběhu diagnostického procesu, ale není indikováno hned:

- „screeningová“ vyšetření u psychiatrických pacientů
- porucha kognitivních funkcí, demence u pacientů starších 60 let
- pravděpodobná synkopa (na základě anamnestických dat) – velké riziko falešně pozitivního EEG nálezu!

Klinické situace, kdy vyšetření není indikováno:

- bolesti hlavy, migréna
- k „vyloučení“ diagnózy epilepsie u jedinců bez klinicky jasných záchvatů
- k vyloučení mozkového nádoru či jiného expanzivního procesu
- nespecifické obtíže charakteru instability, únavy, apod.
- ADHD

Převzato a upraveno podle Guidelines for Clinical Neurophysiology, North Bristol NHS Trust